

Měsíc povědomí o nádorech brzlíku

KVĚTEN



Maligní epitelové nádory brzlíku (thymu)...

...jsou velmi zřídkavé zhoubné nádory vycházející z brzlíku, malého orgánu v horní části hrudníku za hrudní kostí, za normálních okolností zodpovědného za správnou funkci imunitního systému.

Existuje několik druhů maligních epitelových nádorů brzlíku, které se nezřídka nesprávně zaměňují:

Thymomy

Thymomy jsou typicky pomalu rostoucí nádory, které více-méně připomínají normální brzlík. Přes jejich obvykle dobrou prognózu jsou thymomy pokládány za zhoubné nádory, jelikož mohou metastázovat nebo recidivovat. Lidé s thymomy mají poměrně často i jiná onemocnění imunitního systému, především myastenii gravis, což je nemoc projevující se svalovou slabostí.

Karcinom thymu

Buňky u karcinomu brzlíku se už příliš nepodobají normálním thymickým buňkám. Karcinomy brzlíku rostou rychleji než thymomy a v době zjištění se už často stačily rozšířit také do jiných částí těla.

Neuroendokrinní nádory brzlíku

Neuroendokrinní nádory thymu jsou ještě zřídkavější než tymomy a karcinomy thymu. Také patří mezi zhoubné nádory.

Jak se tyto nádory odhalí?

Téměř jedna třetina nádorů brzlíku nemá žádné projevy. Tehdy je lékaři naleznou náhodně během vyšetření pátrajících po jiném onemocnění. Jindy se mohou objevit:

- Bolesti na hrudi
- Potíže s dýchaním
- Dlouhotrvající kašel
- Svalová slabost

Když máte některý z těchto příznaků, Váš lékař může navrhnut CT (počítačovou tomografií) a/nebo MR (magnetickou rezonanci), které zobrazí detailní, počítačově zpracované řezy Vaším hrudníkem. Radiologové při hodnocení těchto obrazů hledají případný nádor a určují jeho stadium - například, jestli postihuje okolní struktury. Někdy je potřebné PET vyšetření, které pomůže odhalit metastázy v jiných orgánech.



Květen

Měsíc povědomí o nádorech brzlíku

Byl Vám diagnostikován
nádor brzlíku?

Tyto informace jsou pro Vás!

Jak léčíme nádory brzlíku?

Vaše léčba bude záviset od typu nádoru a jeho stadia. Typ tumoru zjistí patolog, který pod mikroskopem vyhodnotí odstraněný nádor nebo jeho fragmenty získané odebráním vzorku.

Možnosti léčby zahrnují:

- Chirurgické odstranění
- Radioterapie (Ozařování)
- Chemoterapie

Thymomy, karcinomy i neuroendokrinní nádory thymu jsou velice zřídkavé. Ne všem lékařům jsou důvěrně známé, proto Váš lékař může konzultovat Váš případ s jinými specialisty. Je možné, že budete potřebovat péči tímu, kterého součástí je hrudní chirurg, radioterapeut a onkolog v spolupráci s radiodiagnostikem a patologem zkušeným v diagnostice nádorů brzlíku. Mezinárodní zájmová skupina pro nádory thymu (ITMIG) Vám může být nápomocná při hledání lékařů se zkušenostmi v této oblasti.



Šance na vyléčení nebo riziko recidivy závisí od několika faktorů:

- od typu nádoru
- jestli se nádor rozšířil z brzlíku do jiných tkání nebo orgánů
- jestli je možné tumor kompletně odstranit
- celkového zdravotního stavu
- jestli byl nádor právě diagnostikován nebo se jedná o jeho recidivu



Chcete mluvit s jinými pacienty?

Přidejte se k podpůrným skupinám na Facebooku: (v anglickém jazyce)



Thymoma
Support
Group



Thymic
Carcinoma
Group



Patient
Advocate
Group



FOUNDATION
FOR THYMIC
CANCER
RESEARCH

alebo:

Hledáte více informací?

Navštivte webstránky

International Thymic Malignancy Interest Group a sledujte na YouTube záznamy webinářů o zajímavých témaitech souvisejících s nádory thymu, které pro pacienty na základě jejich často kladených otázeck připravili lékaři věnující se těmto onemocněním.

ITMIG non-profit
YouTube kanál



International Thymic Malignancy Interest Group

<https://itmig.org>



Oskenujte kód pro přístup na webstránku ITMIG a k dalším informacím

Květen - Měsíc povědomí o nádorech thymu

Tento leták vytvořili lékaři a pacienti - členové ITMIG a Nadace pro výzkum rakoviny thymu