

Měsíc povědomí o nádorech brzlíku **KVĚTEN**



**Byl Vám diagnostikován
nádor brzlíku?
Tyto informace jsou pro Vás!**

Maligní epitelové nádory brzlíku (thymu)...

**...jsou velmi zřídkaivé zhoubné nádory
vycházející z brzlíku, malého orgánu v
horní části hrudníku za hrudní kostí, za
normálních okolností zodpovědného za
správnou funkci imunitního systému.**

Existuje několik druhů maligních
epitelových nádorů brzlíku, které se
nezřídka nesprávně zaměňují:

Thymomy

Thymomy jsou typicky pomalu rostoucí
nádory, které více-méně připomínají
normální brzlík. Přes jejich obvykle dobrou
prognózu jsou thymomy pokládány za
zhoubné nádory, jelikož mohou
metastázovat nebo recidivovat. Lidé s
thymomy mají poměrně často i jiná
onemocnění imunitního systému,
především myastenii gravis, což je nemoc
projevující se svalovou slabostí.

Karcinom thymu

Buňky u karcinomu brzlíku se už příliš
nepodobají normálním thymickým
buňkám. Karcinomy brzlíku rostou rychleji
než thymomy a v době zjištění se už často
stačily rozšířit také do jiných částí těla.

Neuroendokrinní nádory brzlíku

Neuroendokrinní nádory thymu jsou ještě
zřídkaější než thymomy a karcinomy
thymu. Také patří mezi zhoubné nádory.

Jak se tyto nádory odhalí?

Téměř jedna třetina nádorů brzlíku nemá
žádné projevy. Tehdy je lékaři naleznou
náhodně během vyšetření pátrajících po
jiném onemocnění. Jindy se mohou
objevit:

- **Bolesti na hrudi**
- **Potíže s dýcháním**
- **Dlouhotrvající kašel**
- **Svalová slabost**

Když máte některý z těchto příznaků, Vás
lékař může navrhnout CT (počítačovou
tomografii) a/nebo MR (magnetickou
rezonanci), které zobrazí detailní,
počítačově zpracované řezy Vaším
hrudníkem. Radiologové při hodnocení
těchto obrazů hledají případný nádor a
určují jeho stadium - například, jestli
postihuje okolní struktury. Někdy je
potřebné PET vyšetření, které pomůže
odhalit metastázy v jiných orgánech.



Květen

Měsíc povědomí o nádorech brzlíku

Jak léčíme nádory brzlíku?

Vaše léčba bude záviset od typu nádoru a jeho stadia. Typ tumoru zjistí patolog, který pod mikroskopem vyhodnotí odstraněný nádor nebo jeho fragmenty získané odebráním vzorku.

Možnosti léčby zahrnují:

- **Chirurgické odstranění**
- **Radioterapii (Ozařování)**
- **Chemoterapii**

Thymomy, karcinomy i neuroendokrinní nádory thymu jsou velice zřídka. Ne všem lékařům jsou důvěrně známy, proto Váš lékař může konzultovat Váš případ s jinými specialisty. Je možné, že budete potřebovat péči týmu, kterého součástí je hrudní chirurg, radioterapeut a onkolog v spolupráci s radiodiagnostikem a patologem zkušeným v diagnostice nádorů brzlíku. Mezinárodní zájmová skupina pro nádory thymu (ITMIG) Vám může být nápomocná při hledání lékařů se zkušenostmi v této oblasti.

Šance na vyléčení nebo riziko recidivy závisí od několika faktorů:

- od typu nádoru
- jestli se nádor rozšířil z brzlíku do jiných tkání nebo orgánů
- jestli je možné tumor kompletně odstranit
- celkového zdravotního stavu
- jestli byl nádor právě diagnostikován nebo se jedná o jeho recidivu



Chcete mluvit s jinými pacienty?
Přidejte se k podpůrným skupinám na Facebooku:



Rakovina brzlíku -
Thymom CZ



Hledáte více informací?

Navštivte webstránky **International Thymic Malignancy Interest Group** a sledujte na YouTube záznamy webinářů o zajímavých tématech souvisejících s nádory thymu, které pro pacienty na základě jejich často kladených otázek připravili lékaři věnující se těmto onemocněním.

ITMIG non-profit
YouTube kanál



International
Thymic
Malignancy
Interest Group

<https://itmig.org>



Oskenujte kód pro přístup
na webstránku ITMIG
a k dalším informacím

Květen - Měsíc povědomí o nádorech thymu

Tento leták vytvořili lékaři a pacienti -
členové ITMIG a Nadace pro výzkum rakoviny thymu