

Měsíc povědomí o malignitách brzlíku

KVĚTEN



**Byl Vám diagnostikován
nádor brzlíku?**

Tyto informace jsou pro Vás!

Nádory epitelu brzlíku...

...jsou velmi vzácné zhoubné novotvary pocházející z brzlíku, malého orgánu v horní části hrudníku za hrudní kostí, který je normálně zodpovědný za správnou funkci imunitního systému.

Existují tři typy epiteliálních nádorů brzlíku a jejich názvy se často zaměňují:

Thymomy

Thymomy jsou typicky pomalu rostoucí nádory, které se více či méně podobají normálnímu brzlíku. Navzdory obvykle příznivému průběhu jsou thymomy zhoubné nádory, protože mohou metastazovat a/nebo recidivovat. Lidé s diagnózou thymomu často trpí dalšími onemocněními imunitního systému, nejčastěji **MYASTHENIA GRAVIS**, onemocněním, při kterém dochází k oslabení svalů.

Karcinomy brzlíku

U karcinomů brzlíku buňky již nevypadají jako normální buňky brzlíku. Karcinomy brzlíku rostou rychleji než thymomy a v době zjištění rakoviny se často již rozšířily do jiných částí těla.

Neuroendokrinní nádory brzlíku

Neuroendokrinní nádory brzlíku jsou ještě méně časté než thymomy a karcinomy brzlíku. Tyto nádory jsou také zhoubné.

Jak se tyto nádory odhalí?

Téměř třetina všech pacientů s rakovinou brzlíku nemá při diagnóze žádné zjevné příznaky. Rakovina brzlíku je objevena náhodou, když lékaři hledají něco jiného. Mezi příznaky patří:

- **Bolest na hrudi**
- **Potíže s dýcháním**
- **Dlouhotrvající kašel**
- **Svalová slabost**

Pokud máte některý z těchto příznaků, může vám lékař provést CT (počítačovou tomografii) a/nebo MRI (magnetickou rezonanci) hrudníku. Radiolog vyhodnotí snímky a zjistí, zda se nádor rozšířil do okolních struktur. Může Vám být také provedeno PET vyšetření (pozitronová emisní tomografie), které může odhalit metastázy (sekundární nádory) v jiných orgánech.



May

Thymic Malignancy Awareness Month

Jak se léčí rakovina brzlíku?

Léčba závisí na typu onemocnění a jeho stadiu. Typ onemocnění určí patolog, který analyzuje nádor nebo jeho fragmenty pod mikroskopem.

Mezi léčebné metody patří:

- **Chirurgický zákrok**
- **Radioterapie (Ozařování)**
- **Chemoterapie**

Thymomy, karcinomy brzlíku a neuroendokrinní nádory brzlíku jsou velmi vzácné. Ne všichni lékaři s nimi mají zkušenosti, proto může Váš lékař konzultovat Váš případ s jinými specialisty. Váš případ může vyžadovat léčbu týmem, který se skládá z hrudního chirurga, radiologa a onkologa, ve spolupráci s radiodiagnostikem a patologem zkušeným v diagnostice nádorů brzlíku. Mezinárodní zájmová skupina pro maligní onemocnění brzlíku (ITMIG) Vám může pomoci najít lékaře se zkušenostmi v této oblasti.



KVĚTEN – Měsíc povědomí o zhoubných nádorech brzlíku

Tento leták byl vytvořen lékaři a pacienty – členy ITMIG a Nadace pro výzkum rakoviny brzlíku.

Poslední aktualizace – 2025

Šance na uzdravení nebo riziko recidivy závisí na několika faktorech:

- Typ nádoru
- Míra rozšíření nádoru mimo brzlík do jiných tkání nebo orgánů
- Zda lze nádor chirurgicky zcela odstranit
- Celkový zdravotní stav pacienta
- Zda byl nádor právě diagnostikován nebo se vrátil



Nejste sami!

Potřebujete si promluvit s jinými pacienty?

Připojte se k níže uvedeným podpůrným skupinám na Facebooku:

- ➔ [Podpůrná skupina pro thymom](#)
- ➔ [Skupina pro karcinom brzlíku](#)
- ➔ [Skupina na podporu pacientů](#)
- ➔ [Skupina na podporu pacientů v českém jazyce](#)




- ➔ [NADACE PRO VÝZKUM RAKOVINY BRZLÍKU](#)

Potřebujete více informací?

YouTube kanál

Navštivte webovou stránku [Mezinárodní skupiny pro závažná onemocnění brzlíku \(ITMIG\)](#). ITMIG má také vlastní stránku na YouTube, kde si můžete prohlédnout záznamy webinářů připravených lékaři na témata, která zajímají pacienty s nádory brzlíku, a kde jsou zodpovězeny otázky

[ITMIG Nezisková organizace](#)



Vyhledejte přístup na webové stránky ITMIG a další informace

